

ФОРМУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГБУЗ ИРКУТСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (с показаниями для ГБУЗ «ИОКБ»).

Все препараты разделены на 3 группы:

1. широко применяемые, закупаются для ежемесячного потребления
2. препараты отпускаемые из аптеки ГБУЗ «ИОКБ» по рапорту:
 - a) при неэффективности 1 группы
 - b) при непереносимости 1 группы
 - c) из-за редкости показаний
 - d) из-за высокой стоимости
3. закупаются только по решению врачебной комиссии

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА

Антагонисты Са

1	Верапамил р-р для внутривенного введения, таблетки, ретардные формы внутрь	<ul style="list-style-type: none"> • купирование и профилактика пароксизмальной тахикардии • уменьшение частоты желудочковых сокращений при суправентрикулярных тахикардиях • артериальная гипертензия (при противопоказаниях к бета-адреноблокаторам) • стенокардия вазоспастическая, а также при противопоказаниям к бета – адреноблокаторам • гипертрофическая кардиомиопатия
1	Нифедипин таблетки короткого действия	<ul style="list-style-type: none"> • для ОПЦ
1	Амлодипин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • артериальная гипертензия • стенокардия, в т.ч. вазоспастическая
1	Нимодипин р-р для инфузии, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • неврологические нарушения ишемического генеза при субарахноидальном кровоизлиянии

Антиаритмические

1	Прокаинамид р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • предсердная тахикардия • мерцание и трепетание предсердий • желудочковые аритмии в т.ч. после ИМ
1	Лидокаин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • желудочковые аритмии
1	Амиодарон р-р для внутривенного введения, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • пароксизмальные наджелудочковые и желудочковые тахикардии • мерцание и трепетание предсердий • фибрилляция желудочков
3	Соталол р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • купирование жизнеугрожающих аритмий (наджелудочковых и желудочковых)

β- адреноблокаторы

1	Метопролол в\в, таблетки в т.ч. пролонгированный	<ul style="list-style-type: none"> • артериальная гипертензия • ИМ • Суправентрикулярные и желудочковые аритмии
----------	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ХСН (хроническая сердечная недостаточность) гипертрофический субаортальный стеноз тиреотоксикоз
1	Карведилол таблетки	<ul style="list-style-type: none"> артериальная гипертония стенокардия ИМ (особенно при низкой фракции выброса) ХСН
1	Эсмолол раствор для в\в введения	<ul style="list-style-type: none"> Для контроля АД, ЧСС в отделениях реанимации Гипертензивный криз
2	Пропафенон раствор для в\в введения	<ul style="list-style-type: none"> Торпидные желудочковые тахикардии, в т.ч. при ВПУ и синдроме Клерка - Леви - Кристеско
3	Бисопролол таблетки	<ul style="list-style-type: none"> См. метопролол

α- адреноблокаторы

1	урапидил раствор для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> Гипертонический криз Рефрактерная артериальная гипертония
3	Доксазозин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> артериальная гипертония в сочетании с ДГПЖ (доброкачественная гипертрофия предстательной железы) для улучшения уродинамики после трансплантации почки

Нитраты

1	Нитроглицерин в\ в, таблетки, аэрозоль	<ul style="list-style-type: none"> купирование стенокардии ИМ при сохраняющейся ишемии миокарда, АГ и сердечной недостаточности гипертонический криз спазм сфинктера Одди, в т.ч. при ретроградной холецистографии
1	Изосорбида динитрат в \в, аэрозоль, внутрь (пролонгированные)	<ul style="list-style-type: none"> см. нитроглицерин пролонгированные формы – профилактика стенокардии портальная гипертония кровотечения из верхнего отдела ЖКТ в сочетании с терлипессином
1	Изосорбида мононитрат	<ul style="list-style-type: none"> профилактика стенокардии на фоне печеночной недостаточности

Антиангинальные

2	Ивабрадин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> стабильная стенокардия у пациентов с нормальным синусовым ритмом при непереносимости или противопоказаниях к применению бета-блокаторов
---	---------------------------	---

Ингибиторы фосфодиэстеразы

3	Силденафил таблетки	<ul style="list-style-type: none"> легочная гипертония (для отделения кардиохирургии №2)
---	----------------------------	---

Гипотензивные и сосудорасширяющие

1	Каптоприл таблетки	<ul style="list-style-type: none"> артериальная гипертония (АГ) ХСН Диабетическая нефропатия
1	Эналаприл таблетки ,	<ul style="list-style-type: none"> см. каптоприл

	Эналаприлат раствор для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> эналаприлат – гипертонический криз, особенно с левожелудочковой недостаточностью
3	Рамиприл таблетки	<ul style="list-style-type: none"> АГ и нефропротекция
2	Метилдофа таблетки	<ul style="list-style-type: none"> АГ при беременности
2	Моксонидин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> Артериальная гипертензия
2	Фозиноприл таблетки	<ul style="list-style-type: none"> Для отделения гемодиализа
2	Лизиноприл таблетки	<ul style="list-style-type: none"> АГ Сердечная недостаточность Диабетическая нефропатия
2	Периндоприл таблетки	<ul style="list-style-type: none"> См.Лизиноприл
2	Лозартан таблетки	<ul style="list-style-type: none"> АГ, ХСН, при непереносимости иАПФ Нефропротекция (монотерапия) или с ингАПФ
1	Азаметония бромид р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> Гипертонический криз, особенно с левожелудочковой недостаточностью Эклампсия
1	Клонидин р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> Гипертонический криз
3	Ницерголин лиоф. порошок для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> тромбозы и эмболии мозговых сосудов транзиторные ишемии мозга гипертензивный криз облитерирующий эндоартериит
2	Винпоцетин таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> состояние после перенесенного ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения)
2	Дипиридамола таблетки	<ul style="list-style-type: none"> плацентарная недостаточность ишемический инсульт
3	Алпростадил	<ul style="list-style-type: none"> облитерирующие поражения периферических артерий атеросклеротического, диабетического, воспалительного генеза
1	Периндоприл+индапамид	<ul style="list-style-type: none"> артериальная гипертензия

Кардиотоники и вазопрессоры

1	Эпинефрин в амп., во флаконах	<ul style="list-style-type: none"> анафилактический шок гипогликемия остановка кровообращения
1	Дофамин в \в	<ul style="list-style-type: none"> кардиогенный шок при ИМ и операциях на сердце септический и другие виды шока острая сердечная недостаточность острая преренальная почечная недостаточность
2	Левосимендан	<ul style="list-style-type: none"> острая сердечная недостаточность, рефрактерная к стандартной терапии, при неэффективности ВАБК
1	Добутамин в \в	<ul style="list-style-type: none"> острая сердечная недостаточность при ИМ, операциях на сердце, кардиомиопатиях
1	Дигоксин в \в, таблетки Таблетки для детей	<ul style="list-style-type: none"> ХСН суправентрикулярная тахикардия, особенно мерцательная аритмия
1	Фенилэфрин в \в	<ul style="list-style-type: none"> острая артериальная гипотензия
1	Норэпинефрин в \в	<ul style="list-style-type: none"> см. Фенилэфрин
2	Аторвастатин	<ul style="list-style-type: none"> Для эндотелийпротекции и нормализации липидов
2	Фенофибрат таблетки	<ul style="list-style-type: none"> Гиперлипотеинемии IIa, IIb, III и IV типов Диабетическая ретинопатия

Диуретики

1	Фуросемид р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Отеки • отек легких • олигурия при почечной недостаточности • АГ • Гипертензивный криз • Асцит при циррозе печени
1	Гидрохлортиазид таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Отеки • АГ
1	Спиронолактон внутрь	<ul style="list-style-type: none"> • Альдостероновые отеки • Отечно-асцитический синдром при циррозе печени • Нефротический синдром • Хроническая сердечная недостаточность • Гипокалиемия
1	Ацетазоламид внутрь	<ul style="list-style-type: none"> • Глаукома • Эпилепсия • Легочно-сердечная недостаточность • для сочетания с петлевыми диуретиками
1	Маннитол р-р для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> • острая почечная недостаточность • осмотический диурез при остром отравлении • отек головного мозга • острое повышение внутриглазного давления
1	Индапамид таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • артериальная гипертензия
2	Торасемид таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Резистентные отёки при ХСН и циррозе печени (как альтернатива фуросемиду) • Артериальная гипертензия III стадии
1	Эплеренон таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Терапия ХСН

Противовоспалительные

1	Ацетилсалициловая кислота внутрь	<ul style="list-style-type: none"> • стабильная и нестабильная стенокардия • ИМ, профилактика повторного ИМ • Шунтирование коронарных артерий • Чрескожная реваскуляризация миокарда • Вторичная профилактика ишемического инсульта и преходящих НМК, периферический атеросклероз • МА при низком риске тромбоэмболических осложнений или при противопоказаниях к варфарину
1	Диклофенак таблетки, р-р для инъекций, суппозитории Капли глазные	<ul style="list-style-type: none"> • Артриты • Артрозы • Остеохондроз • Люмбаго • Ишиас • Миалгии • Воспалительные заболевания внесуставных и мягких тканей • Острый приступ подагры
	Цитостатики и глюкокортикоиды	<ul style="list-style-type: none"> • см. соотв.разделы

Антиаллергические

	Глюкокортикоиды	<ul style="list-style-type: none"> • см. соотв. Разделы
--	------------------------	--

1	Дифенгидрамин р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • купирование аллергических реакций • потенцирование анальгетиков
1	Хлорпирамин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • см. дифенгидрамин
2	Лоратадин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • показания: см. выше
2	Цетиризин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Симптоматическая терапия аллергических заболеваний и состояний

Бронхолитики

1	Фенотерол аэрозоль, р-р для ингал.	<ul style="list-style-type: none"> • приступ БА и другие бронхообструктивные состояния
1	Ипратропиум аэрозоль, р-р для ингал.	<ul style="list-style-type: none"> • хронический обструктивный бронхит • БА • Бронхиальная обструкция на фоне простудных заболеваний
1	Беклометазон аэрозоль	<ul style="list-style-type: none"> • Бронхиальная астма
1	Сальбутамол в\в, аэрозоль	<ul style="list-style-type: none"> • тяжелые приступы бронхиальной обструкции • астматический статус
1	Формотерол/будесонид	<ul style="list-style-type: none"> • БА • ХОБЛ
1	Сальметерол/флутиказон	<ul style="list-style-type: none"> • БА • ХОБЛ
1	Ипратропия бромид/фенотерол р-р для ингаляций	<ul style="list-style-type: none"> • хронический обструктивный бронхит • БА
1	Аминофиллин р-р для в\ в введения	<ul style="list-style-type: none"> • Бронхообструктивный синдром • Потенцирование мочегонной терапии • нарушение мозгового кровообращения
1	Будесонид суспензия для небулайзера	<ul style="list-style-type: none"> • бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии ГКС; • хроническая обструктивная болезнь легких
1	Индакатерол капс.	<ul style="list-style-type: none"> • хроническая обструктивная болезнь легких
1	Теофиллин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • обратимая бронхиальная обструкция
3	гликопирроний	<ul style="list-style-type: none"> • ХОБЛ
3	Гликопирроний/индакатерол	<ul style="list-style-type: none"> • ХОБЛ
3	Тиотропия бромид капсулы, раствор для ингаляций	<ul style="list-style-type: none"> • хронический обструктивный бронхит

Отхаркивающие, муколитики, противокашлевые

1	Амброксол таблетки, р-р для ингал.	<ul style="list-style-type: none"> • острые и хронические заболевания дыхательных путей с вязкой мокротой • бронхоэктатическая болезнь • респираторный дистресс- синдром у новорожденных
2	Порактант альфа	<ul style="list-style-type: none"> • для профилактики и лечения респираторного дистресс-синдрома у детей
2	Ацетилцистеин порошок, р-р для ингал, комбинированные препараты	<ul style="list-style-type: none"> • затрудненное отхождение мокроты при бронхите, БА, пневмонии, бронхоэктатической болезни, муковисцидозе легких • профилактика осложнений после операции на органах дыхания

Нейротропные

1	Вальпроевая кислота таблетки, лиоф. пор. для приг. р-ра для в/в введения таблетки пролонг действия	<ul style="list-style-type: none"> • все формы эпилепсии • эпилептический статус
1	Диазепам таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • премедикация, • тревожные состояния • все виды судорог, в том числе эпилептический статус • абстиненция при алкоголизме
3	Леводопа таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Паркинсонизм, кроме лекарственного
1	Карбамазепин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Парциальные припадки, • первично- генерализованные тонико-клонические припадки • невралгия тройничного нерва • профилактика маниакально-депрессивных нарушений
1	Дроперидол в\в	<ul style="list-style-type: none"> • для нейролептанальгезии (обычно в сочетании с фентанилом) • психомоторное возбуждение в послеоперационном периоде
2	Галоперидол для в\в и в\м введения	<ul style="list-style-type: none"> • при психомоторных возбуждениях
1	Хлорпромазин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • психотропное возбуждение • выраженная тревога, состояния страха • подготовка к анестезии • потенцирование анестезии • обезболивание родов • эклампсия • купирование тяжелой рвоты • эпилептический статус (при неэффективности других методов)
3	Циннаризин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Ишемический инсульт
1	Глицин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Ишемический инсульт • Черепно-мозговая травма
1	Амитриптилин таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Депрессия различной этиологии, особенно с тревожным синдромом и ажитацией • Неврогенные боли хронического характера
1	Кофеин-бензоат натрия	<ul style="list-style-type: none"> • для стимуляции дыхательного центра и при легкой сосудистой слабости
2	Зопиклон таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Бессонница болевого, эмоционального, соматического генеза
2	Сертралин капсулы, табл	<ul style="list-style-type: none"> • Депрессии
3	Эсциталопрам таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Депрессии, в т.ч. в постинсультном периоде; посттравматические, стрессовые расстройства.
3	Мидазолам р-р для в\м и в\в введения	<ul style="list-style-type: none"> • нарушения сна • сомнабулизм • премедикация
2	Прегабалин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • нейропатическая боль • парциальная эпилепсия

1	Неостигмина метилсульфат таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • атония кишечника и мочевого пузыря • миастения • параличи • парезы • неполяризующий нервно-мышечный блок
1	Цитиколин раствор	<ul style="list-style-type: none"> • Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу
2	Церебролизин раствор	<ul style="list-style-type: none"> • Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу
3	Пирацетам таблетки, р-р для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> • Энцефалопатии различного генеза
3	Гопантенная кислота таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Для перинатального центра • Впервые возникший судорожный синдром
1	Холина альфосцерат р-р для инъекций, капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • Нарушения памяти, сознания • Нарушение мотиваций, концентрации внимания при ишемическом инсульте • При хроническом нарушении мозгового кровообращения • ЧМТ.
1	Бетагистин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Кохлеовестибулярные расстройства
1	Депротеинизированный гемодериват р-р	<ul style="list-style-type: none"> • Хронические осудистые и метаболические нарушения
2	Тизанидин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Гипертонус поперечно-полосатой мускулатуры • Облитерирующие сосудистые заболевания
3	Мемантин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Паркинсонизм и синдром паркинсонизма • Деменция
2	Этилметилгидроксипиридина сукцинат раствор	<ul style="list-style-type: none"> • Острое нарушение мозгового кровообращения • Дисциркуляторная энцефалопатия
3	Ботулинический токсин раствор для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Терапия синдрома «спастической руки» у больных с ОНМК
3	Амантадина сульфат раствор для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Синдром паркинсонизма
2	Цитофлавин р-р для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> • Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу (в первые 3 часа), в т. ч. при кардиохирургических операциях с ИК

Средства, влияющие на систему свертывания крови

1	Гепарин натрий р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Нестабильная стенокардия, ИМ • тромбоз глубоких вен нижних конечностей • тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) • кардиохирургические операции • неотложная кардиоверсия • кардиоверсия при затянувшейся МЦА (мерц. аритмии) • острый тромбоз периферических артерий • синдром ДВС
---	--	--

1	Эноксипарин натрия	<ul style="list-style-type: none"> • нестабильная стенокардия • ИМ без зубца Q (в сочетании с АСК) • тромбоз глубоких вен • профилактика тромбоземболий • профилактика гиперкоагуляции при гемодиализе
2	Надропарин кальция	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика тромбоземболий
3	Дальтепарин натрия	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика тромбоземболий
1	Фондапаринкус натрия	<ul style="list-style-type: none"> • нестабильная стенокардия • ИМ без зубца Q (в сочетании с АСК) • тромбоз глубоких вен • профилактика тромбоземболий
3	Бивалирудин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	<ul style="list-style-type: none"> • проведение ЧТКВ у пациентов с ИБС при повышенном риске кровотечения • гепариновая тромбоцитопения
2	Сулодексид капс., р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • ишемия конечностей атеросклеротического и диабетического генеза • диабетическая нефропатия • антифосфолипидный синдром с АСК • гепариновая тромбоцитопения
2	Альтеплаза лиоф. пор. для приг. р-ра	<ul style="list-style-type: none"> • острый ИМ • массивная ТЭЛА • острая артериальная тромбоземболия • тромбоз центральной артерии и вены сетчатки • тромбоз артерио-венозных шунтов
2	Варфарин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • протезы клапанов сердца • профилактика и лечение тромбоза глубоких вен нижних конечностей • профилактика тромбоземболии при МЦА
2	Клопидогрель табл	<ul style="list-style-type: none"> • при непереносимости АСК • стабильная и нестабильная стенокардия • ИМ, профилактика повторного ИМ • Шунтирование коронарных артерий • Чрескожная реваскуляризация миокарда
2	Эптифибатид раствор для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> • При обширных инфарктах миокарда, в том числе сопровождающихся кардиогенным шоком
2	Тикагрелор таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • При непереносимости клопидогреля
2	Ривароксабан таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика инсульта и системной тромбоземболии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения
3	апиксабан	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика венозной тромбоземболии
2	Дабигатрана этексилат	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика инсульта и системной тромбоземболии у пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения
1	Пентоксифиллин р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • дисциркуляторная энцефалопатия • нарушения периферического кровообращения • сосудистые нарушения внутреннего уха
1	Протамина сульфат р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • кровотечения, вызванные гепарином • нейтрализация гепарина в экстракорпоральных емкостях

1	Менадиона натрия бисульфит р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • кровотечения, вызванные дефицитом витамина К • механическая желтуха • передозировка антикоагулянтов непрямого действия
2	Факторы свертывания II, IX, VII, X	<ul style="list-style-type: none"> • лечение кровотечений и профилактика кровотечений при оперативных вмешательствах у пациентов с приобретенным дефицитом факторов протромбинового комплекса, например, при дефиците, вызванном лечением антагонистами витамина К или передозировкой антагонистов витамина К, в случаях, когда требуется быстрая коррекция дефицита
3	Фактор свертывания VIII+ фактор Виллебранда	<ul style="list-style-type: none"> • гемофилия А • болезнь Виллебранда
3	Фактор свертывания IX	<ul style="list-style-type: none"> • гемофилия В
3	Фактор свертывания VII	<ul style="list-style-type: none"> • ингибиторная форма гемофилии
1	Этамзилат р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • микроциркуляторные геморрагии • диабетическая микроангиопатия
1	Аминокапроновая кислота р-р для инфузий	<ul style="list-style-type: none"> • фибринолитические кровотечения • профилактика и лечение кровотечений, связанных с дефектами тромбоцитов (из паренхиматозных органов и слизистых)
1	Транексамовая кислота р-р для инфузий	<ul style="list-style-type: none"> • фибринолитические кровотечения • профилактика и лечение кровотечений, связанных с дефектами тромбоцитов (из паренхиматозных органов и слизистых)
1	Апротинин	<ul style="list-style-type: none"> • фибринолитические кровотечения • гипокоагуляционная фаза ДВС • профилактика кровотечений при операциях на открытом сердце и крупных сосудах • тяжелое течение инсульта • панкреатиты (в случае повышения уровня ферментов в крови)

Цитостатики, иммунодепрессанты, моноклональные антитела

1	Метотрексат
2	Микофенолата мофетил внутрь-профилактика отторжения при пересадке почки
2	Микофеноловая кислота -профилактика отторжения при пересадке почки; -нефриты с резистентностью к ГКС
1	Цитарабин
1	Даунорубимицин
1	Хлорамбуцил
1	Мелфалан
1	Циклофосфамид
1	Винкристин
1	6- меркаптопурин
1	Этопозид
1	Гидроксикарбамид
2	Третиноин
2	Доксорубицин
2	Циклоспорин
2	Идарубицин
2	Митоксантрон
2	L- аспарагиназа
2	Флударабин

2	Такролимус-профилактика отторжения при пересаженной почке
3	Эверолимус - снижение нефротоксичности циклоспорина после пересадки почки
2	Ломустин
2	Азатиоприн внутрь
2	Бортезомиб для проведения первичного курса при множественной миеломе
2	Базиликсимаб р-р для в/в введения- профилактика отторжения пересаженной почки
3	Блеомицин
3	Ритуксимаб
3	Митомицин-С-для офтальмологии
3	Азацитидин
3	бендамустин
3	Иматиниб
3	Ранибизумаб для офтальмологии

Сопутствующие средства

2	Кальция фолинат	<ul style="list-style-type: none"> • интоксикация антагонистами фолиевой кислоты (метотрексатом)
2	Аллопуринол	<ul style="list-style-type: none"> • гиперурикемия, подагра, уратный нефролитиаз
3	Трописетрон раствор, капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика и купирование тошноты и рвоты при химиотерапии, лучевой терапии и в послеоперационном периоде
2	Ондансетрон ректально и сублингвально	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика и купирование тошноты и рвоты при химиотерапии, лучевой терапии и в послеоперационном периоде

Стимуляторы кроветворения

1	Железа сульфат таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • железодефицитная анемия
1	Цианкобаламин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Мегалобластные анемии в т.ч. при: <ul style="list-style-type: none"> - гастрэктомии - колиты - при поражении поджелудочной железы - беременным (только при наличии макроцитарной анемии) • Поражения периферической нервной системы
2	Железа (III) гидроксид полиизомальтозат р-р для в/м введения	<ul style="list-style-type: none"> • железодефицитная анемия при неэффективности и невозможности перорального применения железа
3	Железа карбокси мальтозат раствор для в/в введения	<ul style="list-style-type: none"> • лечение анемии с уровнем Hb ниже 80 г/л (у пациенток областного перинатального центра)
2	Эпоэтин альфа или бета	<ul style="list-style-type: none"> • анемии при ХПН и онкологических заболеваниях
3	Дарбопоэтин альфа	<ul style="list-style-type: none"> • анемия при ХПН
2	Фолиевая кислота таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • фолиеводефицитная гиперхромная анемия
3	Ромипластим	<ul style="list-style-type: none"> • при неэффективности ГКС и иммуноглобулинов
3	Филграстим	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика и лечение цитостатической нейтропении

Средства для лечения заболеваний ЖКТ

1	Омепразол капсулы, р-р для в\в введения	<ul style="list-style-type: none"> • ЯБЖ и ЯБ двенадцатиперстной кишки • ГЭРБ • НПВС-гастропатия • синдром Золингера – Эллисона • прочие гиперсекреторные синдромы • кровотечения из верхних отделов ЖКТ
2	Эзомепразол р-р для в\в инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • Кровотечения ЖКТ • Стрессовые язвы ЖКТ
1	Фамотидин раствор	<ul style="list-style-type: none"> • см. омепразол, а также: • профилактика аспирационной пневмонии (перед наркозом за 4 ч) • панкреатиты
1	Алгедрат+магния гидроксид	<ul style="list-style-type: none"> • боль, изжога и другие диспепсии гиперацидного генеза при заболеваниях ЖКТ • функциональные диспепсии
1	Метоклопрамид таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • рвота, тошнота • рефлюкс-эзофагит • атония желудка и 12-п кишки • подготовка к диагностическим исследованиям ЖКТ
1	Глицирризиновая кислота+фосфолипиды капсулы, раствор	<ul style="list-style-type: none"> • токсические поражения печени • хронические гепатиты • цирроз печени • стеатоз печени
3	Адеметионин лиоф. пор. для приг. р-ра, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • синдромом холестаза • токсические поражения печени различной этиологии (в т.ч. алкогольной, вирусной, лекарственной /антибиотики, противоопухолевые средства, противотуберкулезные и противовирусные препараты, трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы/); • хронический гепатит; • цирроз печени;
1	Атропина сульфат р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • брадикардия • выскальзывающие желудочковые аритмии при АВ-блокадах • желудочковые тахикардии типа «пируэт» • спастические синдромы в ЖКТ • предупреждение вагусных осложнений в анестезиологии •
1	Папаверин гидрохлорид р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • спастические синдромы в ЖКТ
1	Дротаверин таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • спастические синдромы
2	Урсодезоксихолевая кислота таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • гепатопротекция • желчегонное действие
3	Мебеверин капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • печёночная колика • в случаях угрозы атонии ЖКТ

1	Сукральфат таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика стресс-язв в отделениях реанимации • рефлюкс-эзофагит • стоматиты • язвенная болезнь желудка и ДПК
1	Бисакодил таблетки, свечи	<ul style="list-style-type: none"> • для подготовки кишечника к операции и рентгеновскому обследованию органов брюшной полости • хронические запоры
1	Панкреатин таблетки, капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • внешнесекреторная недостаточность ПЖ • диспепсии, связанные с нарушением переваривания и всасывания пищи • неинфекционная диарея • подготовка к рентген- и УЗС-обследованию органов брюшной полости • болевой синдром при панкреатитах
2	Висмута трикалия дицитрат таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • ЯБЖ • ЯБ ДПК в комбинации с антисекреторными и антибактериальными препаратами
2	Лоперамид таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • диарея алиментарного, метаболического, аллергического, лекарственного, лучевого, эмоционального генеза
2	Лактулоза сироп	<ul style="list-style-type: none"> • печеночная энцефалопатия • хронические запоры • дизбактериоз кишечника
2	Макрогол порошок	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка к диагностическим исследованиям (эндоскопическое, рентгенологическое) и хирургическим вмешательствам на толстом кишечнике.
2	Магния сульфат внутрь	<ul style="list-style-type: none"> • Слабительное • Желчегонное • Промывание желудка при отравлении растворимыми солями бария
2	Сульфасалазин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • неспецифический язвенный колит • болезнь Крона
2	Месалазин свечи, суспензия для клизм	<ul style="list-style-type: none"> • неспецифический язвенный колит • болезнь Крона
2	Бактериофаги: сальмонеллезный, протейный, синегнойный, клебсиеллезный, стафилококковый, поливалентный, пиобактериофаг	

Вакцины, иммуноглобулины, сыворотки

1	Иммуноглобулин человека антирезус раствор для внутримышечного введения, раствор для инъекций
2	Интерферон -α 2b – р-р для инъекций, суппозитории
2	Интерферон -α 2a - лиоф.порошок для приг инъекционного р-ра
2	Сыворотки: противоботулинические А, В, Е., противогангренозная поливалентная, противостолбнячная, анитоксин против яда гадюки обыкновенной
2	Столбнячный анатоксин
2	Иммуноглобулин антилимфоцитарный -при апластической анемии
3	Вакцина антирабическая культурная концентрированная сухая- Россия или " Рабипур"
3	Иммуноглобулин антирабический "имогам раж" для пассивной иммунизации травмированных в сочетании с антирабической вакциной
3	Антитимоцитарный глобулин -при пересадке почки
3	Иммуноглобулин против цитомегаловируса –инфекция у новорожденных ; инфекция у пациентов с трансплантированной почкой.

3	Иммуноглобулин человека нормальный
----------	---

Гормоны, антигормоны, противодиабетические, метаболические

1	Инсулин ультра КД	<ul style="list-style-type: none"> • СД типа 1 • Декомпенсация СД
1	Инсулин КД	<ul style="list-style-type: none"> • кетоацидоз, особенно кома • поражения печени, почек • плохое заживление ран при СД
1	Инсулин ДлД	<ul style="list-style-type: none"> • СД
1	Инсулин СрД	<ul style="list-style-type: none"> • Беременность при СД типа 2 • при истощении β-клеток и резистентности к оральным средствам
1	Глибенкламид табл	<ul style="list-style-type: none"> • СД типа 2
2	Гликлазид табл	<ul style="list-style-type: none"> • СД типа 2
2	Глимепирид табл	<ul style="list-style-type: none"> • СД 2 типа
3	Гликвидон табл	<ul style="list-style-type: none"> • СД типа 2 с поражением почек
3	Саксаглиптин табл	<ul style="list-style-type: none"> • СД 2 типа
1	Метформин	<ul style="list-style-type: none"> • СД типа 2, особенно в сочетании с ожирением
1	Левотироксин натрий таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Гипотиреоз • Аутоиммунный тиреоидит • Эутиреоидный зоб и опухоли щитовидной железы
1	Тиамазол таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • Тиреотоксикоз • подготовка к тиреоидэктомии • тиреотоксический криз
2	Пропилтиоурацил таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • тиреотоксикоз у беременных
2	Флудрокортизон таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • болезнь Аддисона • сольтеряющая форма адреногенитального синдрома • конституциональная и ортостатическая гипотензия
1	Преднизолон таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • воспалительные, аллергические, аутоиммунные заболевания • аллергические реакции • острая и хроническая надпочечниковая недостаточность • острые лейкозы • отек мозга • анафилактический шок • астматический статус • рассеянный склероз
1	Метилпреднизолон лиоф. Для приг р-ра для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • см. Преднизолон
1	Дексаметазон таблетки, р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • см. Преднизолон
1	Триамцинолона ацетонид для внутрисуставного введения	<ul style="list-style-type: none"> • см. Бетаметазон
1	Гидрокортизон р-р для инъекций, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • острая недостаточность коры надпочечников • анафилактический шок
2	Десмопрессин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • несахарный диабет • гемофилия А легкого течения • болезнь Виллебранда I и III типа

3	Терлипрессин раствор	<ul style="list-style-type: none"> пищеводные кровотечения на фоне портальной гипертензии
2	Бромокриптин таблетки	<ul style="list-style-type: none"> гиперпролактинемия для подавления лактации болезнь и синдром Паркинсона (кроме лекарственного)
2	Хорионический гонадотропин лиофил. для приг. р-ра для в/м введения	<ul style="list-style-type: none"> гипогонадизм вторичный ложный крипторхизм индукция овуляции
2	Октреотид р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> при кровотечениях из верхних отделов ЖКТ профилактика осложнений после операций на pancreas при острых панкреатитах, обострениях хронического панкреатита при эндокринных опухолях в ЖКТ
2	Тиоктовая кислота р-р	<ul style="list-style-type: none"> диабетическая нейропатия
2	Дидрогестерон	<ul style="list-style-type: none"> эндометриоз привычный выкидыш дисфункциональное маточное кровотечение дисменорея аменорея
2	Этинилэстрадиол + Левоноргестрел табл	<ul style="list-style-type: none"> гипогонадизм у женщин гиперменорея эндометриоз
2	Прогестерон капсулы	<ul style="list-style-type: none"> привычный выкидыш
3	Глюкагон	<ul style="list-style-type: none"> тяжелая гипогликемия передозировка бета-блокаторов
1	Левокарнитин р-р	<ul style="list-style-type: none"> стимуляция пищевого рефлекса и ускорение роста у новорожденных с низкой массой и недоношенных детей
2	Фосфокреатин р-р	<ul style="list-style-type: none"> при интраоперационной ишемии миокарда
2	Актовегин р-р	<ul style="list-style-type: none"> сосудистые и метаболические нарушения

Препараты при нарушениях кальциевого и костного метаболизма

1	Кальция карбонат	<ul style="list-style-type: none"> нефрогенная остеопатия
2	Дигидротахистерол Альфакальцидиол	<ul style="list-style-type: none"> гипокальциемия при гипопаратиреозе профилактика гипокальциемии после тиреоидэктомии гиперпаратиреоз при ХПН почечная остеодистрофия
2	Кальцитонин для инъекций, аэрозоль в нос	<ul style="list-style-type: none"> болезнь Педжета гиперкальциемия остеопороз
2	Клодроновая кислота	<ul style="list-style-type: none"> остеолиз гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях миелома
3	Цинакальцет	<ul style="list-style-type: none"> вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, находящихся на диализе
3	Парикальцитол	<ul style="list-style-type: none"> вторичный гиперпаратиреоз у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности
2	Золедроновая кислота	<ul style="list-style-type: none"> метастатический остеолит, миелома

Препараты, повышающие тонус и сократимость матки

1	Окситоцин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> возбуждение и стимуляция родовой деятельности гипотония и атония матки после родов, аборта для лактостаза в раннем послеродовом периоде
---	----------------------------	---

2	Простагландин E₂ интравaginaльно	<ul style="list-style-type: none"> • родовозбуждение, прерывание беременности на 12-28 нед • несостоявшийся аборт • внутриутробная смерть плода • пузырный занос
1	Мифепристон табл	<ul style="list-style-type: none"> • медикаментозное прерывание беременности
1	Мизопроустол табл	<ul style="list-style-type: none"> • медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках
2	Простагландин F_{2α}	<ul style="list-style-type: none"> • прерывание беременности во II триместре
2	Эргометрин	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика и лечение маточного кровотечения после родов или аборта

Токолитики

3	Гексапреналин р-р для в/в введения, таблетки	<ul style="list-style-type: none"> • преждевременные родовые схватки • для расслабления матки перед операциями
---	---	--

Препараты для офтальмологии

1	Пилокарпина гидрохлорид 1% глаз., капли	<ul style="list-style-type: none"> • закрытоугольная глаукома • открытоугольная глаукома • вторичная глаукома
1	Тимолол 0,5% глаз., капли	<ul style="list-style-type: none"> • все формы глаукомы
1	тафлупрост	<ul style="list-style-type: none"> • открытоугольная глаукома
1	Тафлупрост/тимолол	<ul style="list-style-type: none"> • открытоугольная глаукома
1	Мельдоний	<ul style="list-style-type: none"> • ретинопатии • гемофтальм
1	Дорлозамид	<ul style="list-style-type: none"> • открытоугольная глаукома
1	Флуоросцеин натрия	<ul style="list-style-type: none"> • диагностика болезней глаза
1	Атропина сульфат 1% глазные капли	<ul style="list-style-type: none"> • исследование глазного дна • воспаления и травмы глаза
1	циклопентолат	<ul style="list-style-type: none"> • исследование глазного дна • предоперационная подготовка
1	Сульфацил натрия 20 -30 % глаз. капли	<ul style="list-style-type: none"> • хронический дакриоцистит • ячмень • блефариты • иридоциклиты
1	Тауфон 4% глаз. капли	<ul style="list-style-type: none"> • дистрофические поражения сетчатки, роговицы • катаракта
1	Тропикамид 0,5 –1% глаз.капли	<ul style="list-style-type: none"> • мидриатик короткого действия
1	Дексаметазон 0,1% глаз. капли	<ul style="list-style-type: none"> • см Дексаметазон
1	Диклофенак 0,1% глаз.капли	<ul style="list-style-type: none"> • профилактика миоза во время внутриглазных операций (в сочетании с атропином и мезатоном) • профилактика кистозной макулопатии после экстракции катаракты
1	Оксибупрокаин р-р	<ul style="list-style-type: none"> • местная анестезия
1	Ацикловир глаз. мазь	<ul style="list-style-type: none"> • герпетические кератиты
1	Полудан в инъекциях, каплях	<ul style="list-style-type: none"> • вирусные кератоконъюнктивиты, иридоциклиты, ретинит

1	Ципрофлоксацин глаз.капли	<ul style="list-style-type: none"> • Инфекции придатков глаза и переднего отдела глаза
1	Тобрадекс глаз.капли	<ul style="list-style-type: none"> • см.Ципрофлоксацин
1	Левомецетин глаз. капли	<ul style="list-style-type: none"> • Инфекции придатков глаза и переднего отдела глаза
1	Тетрациклиновая глаз. мазь	<ul style="list-style-type: none"> • бактериальные инфекции
2	Метилэтилпиридинола гидрохлорид для инъекций, глазные капли	<ul style="list-style-type: none"> • диабетическая ретинопатия • центральные хориоретинальные дистрофии сетчатки • тромбоз центральной вены сетчатки • защита сетчатки от лазерных и солнечных лучей • послеоперационный период при глаукоме
2	Латанопрост, Травопрост глазные капли	<ul style="list-style-type: none"> • открытоугольная глаукома,офтальмогипертензия (при наличии противопоказаний или рефрактерности к другим средствам) • в комбинации с бета-блокаторами, при неэффективности монотерапии
2	Милдронат табл, ампулы	<ul style="list-style-type: none"> • гемофтальмы • окклюзия центральной артерии сетчатки
2	Лидаза	<ul style="list-style-type: none"> • уменьшение рубцевания роговицы • кератиты • ретинопатии • кровоизлияния в стекловидное тело • для местной анестезии
2	Актовегин - желе глазное Солкосерил-желе	<ul style="list-style-type: none"> • язвы роговицы
2	Ретиналамин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> • сосудистые дистрофии сетчатки

Антисептики

1	Йод
1	Пергидроль
1	Бриллиантовая зелень
1	Хлоргексидин
1	Каля перманганат
1	Бетадин-свечи, раствор
1	Этиловый спирт
2	Метиленовый синий 1% для в\в введения в отд.реанимации

Диагностические средства

1	Бария сульфат
1	Гадолиамид
1	Гадопентетовая кислота
1	Йогексол
1	Йопаמיד
1	Амидотриозат натрия
2	Индигокармин
2	Гадобутрол
2	Метахолина хлорид
3	Йобитридол рентген- исследование для пациентов с ХПН
3	Гадоксетовая кислота
2	Аллергены
2	Гистамин
2	Гель катеджель- для урологии

Средства для наркоза и седации

1	Тиопентал натрия
1	Динитроген оксид
1	Натрия оксибутират
1	Пропофол
1	Кетамин
1	Галотан
2	Изофлуран
1	Севофлуран
3	Десфлюран (при оперативных вмешательствах у пациентов высокого кардиального риска)
1	Дексметомидин

Местные анестетики

1	Лидокаин	<ul style="list-style-type: none"> • купирование желудочковых аритмий
1	Новокаин	<ul style="list-style-type: none"> • местная анестезия (особенно при угрозе злокачественной гипертермии) • новокаиновые блокады
1	Бупивакаин	<ul style="list-style-type: none"> • спинномозговая анестезия
2	Ропивакаин	<ul style="list-style-type: none"> • инфильтрац., проводниковая анестезия • эпидуральная и спинальная анестезия в родах или операциях, обезболивание в послеродовом периоде
1	оксибупрокаин, проксиметакаин	<ul style="list-style-type: none"> • для офтальмологии

Миорелаксанты

1	Пипекурония бромид
1	Суксаметония бромид
1	Атракурия бесилат

Наркотические анальгетики

1	Морфин
1	Тримеперидин
1	Фентанил р-р, пластырь
1	Трамадол
1	Оксикодон/налоксон

Ненаркотические анальгетики

1	Кетопрофен р-р для в\в, в\м, таблетки, свечи
1	Кеторалак р-р для инъекций, глазные капли
1	Метамизол таблетки, р-р для инъекций
1	Парацетамол таблетки, р- р для в\в введения
1	Лорноксикам р-р для инъекций
3	Нефопан раствор

Электролиты и плазмозаменители

1	Калия хлорид	<ul style="list-style-type: none"> • гипокалиемия • при прогрессирующей стенокардии и инфаркте миокарда • в дополнение к антиаритмической терапии • при интоксикации дигиталисом • в послеоперационном периоде для нормализации моторики кишечника
1	Кальция хлорид 10%	<ul style="list-style-type: none"> • гипокальциемия • при гипокальцемической тетании • гиперкалиемия • при передозировке антагонистов кальция
1	Магния сульфат	<ul style="list-style-type: none"> • желудочковые аритмии, связанные с удлинением интервала QT • желудочковая тахикардия типа «пируэт» • дефицит магния • эклампсия • гипертонический криз с судорожным синдромом • профилактика реперфузионного синдрома при тромболизисе
1	Калия йодид	<ul style="list-style-type: none"> • тиреотоксический криз (6 капель насыщенного раствора каждые 4 ч) • подготовка к тиреоидэктомии
1	Калия полистеролсульфонат	<ul style="list-style-type: none"> • гиперкалиемия • ХПН • ОПН
1	Натрия гидрокарбонат	<ul style="list-style-type: none"> • метаболический ацидоз при шоке • остановке кровообращения • при обезвоживании • при заболеваниях почек
2	Инозин/мегломин/метионин/никотинамид/янтарная кислота	<ul style="list-style-type: none"> • отравление этанолом • хроническая алкогольная интоксикация • печеночная недостаточность
1	Натрия хлорид	
1	Растворы электролитные	
1	Калия и магния аспарагинат раствор для инъекций	
1	Декстроза	
1	Препараты для парентерального и энтерального питания (аминокислотные, жировые эмульсии, в т.ч. 2 в 1, 3 в 1, Дипептивен(3), сухие смеси для энтерального питания)	
1	Альбумин	
1	Реополиглюкин	
1	Полиглюкин	
1	Гидроксиэтилкрахмал 130/0,4 степени замещения, характер замещения 9:1. на основе кристаллоидного раствора – коррекция острой гиповолемии	
1	Гидроксиэтилкрахмал 130/0,4 степени замещения, характер замещения 9:1. на основе сбалансированного раствора электролитов – коррекция острой гиповолемии	
1	Реамберин	
1	Модифицированный желатин	
3	Кетостерил	

Витаминные препараты

1	Аскорбиновая кислота раствор для инъекций
1	Тиамин раствор для инъекций
1	Никотиновая кислота раствор для инъекций
1	Пиридоксин раствор для инъекций
1	Токоферол капсулы, амп
1	Ретинол масл. раствор
1	Холекальциферол (Витамин Д ₃) водный раствор

Гипоазотемические, уролитики, уроспазмолитики, проктологические

1	Баралгин р-р для инъекций	<ul style="list-style-type: none"> Болевой синдром спастического генеза
---	----------------------------------	--

1-Левосин или Левомеколь, Ауробин или Ультрапрокт, Гепариновая мазь, Метилурациловая мазь, Цинковая мазь, Свечи с анестезином, метилурацилом, Релиф.

Антимикробные

1	Бензилпеницилин	<ul style="list-style-type: none"> Стрептококковые (тонзиллит, эндокардит, рожистое воспаление) инфекции газовая гангрена
1	Амоксициллин	<ul style="list-style-type: none"> Острый средний отит, острый синусит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония, инфекции мочевыводящих и желчевыводящих путей, хламидийный цервицит у беременных, профилактика бактериального эндокардита, эрадикация <i>H. pylori</i>.
1	Амоксициллин + клавулоновая кислота	<ul style="list-style-type: none"> Острый средний отит, острый синусит, эпиглоттит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония, инфекции кожи и мягких тканей (включая раневую инфекцию после укусов и диабетическую стопу), инфекции желчевыводящих и мочевыводящих путей, интраабдоминальные и тазовые инфекции, сепсис. Профилактика инфекций при колоректальных и гинекологических операциях
1	Ампициллин/сульбактам	<ul style="list-style-type: none"> Инфекции органов дыхания, лор-органов, мочевыводящих и желчевыводящих путей, сепсис, эндокардит, проведение антибиотикопрофилактики
1	Ампициллин	<ul style="list-style-type: none"> Острый средний отит, острый синусит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония, инфекции мочевыводящих и желчевыводящих путей, бактериальный эндокардит (в комбинации с гентамицином).
2	Оксациллин	<ul style="list-style-type: none"> Стафилококковые инфекции (пневмония, эндокардит, менингит, сепсис, инфекции кожи и мягких тканей, костей, суставов)
1	Цефазолин	<ul style="list-style-type: none"> Инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов, внебольничный сепсис, профилактика послеоперационных раневых инфекций: в кардиохирургии, при операциях на пищеводе, желудке, 12-перстной кишке в группах высокого риска (ожирение, снижение кислотности желудочного сока, гипомоторика ЖКТ).
1	Цефотаксим	<ul style="list-style-type: none"> Инфекции верхних и нижних дыхательных путей, желчевыводящих и мочевыводящих путей, интраабдоминальные и тазовые инфекции в сочетании с антианаэробными препаратами. Инфекции мягких тканей, костей и суставов. Бактериальный менингит, сепсис.

1	Цефуроксим	<ul style="list-style-type: none"> • Инфекции верхних и нижних дыхательных путей • Периоперационная профилактика • Инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей , костей и суставов
1	Цефоперазон	<ul style="list-style-type: none"> • Пневмония, включая нозокомиальную, инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов, инфекции желчевыводящих путей, интраабдоминальные инфекции в сочетании с антианаэробными препаратами, сепсис. Инфекции, вызванные <i>P. Aeruginosa</i> в сочетании с амикацином или ципрофлоксацином.
2	Цефоперазон+ Сульбактам	<ul style="list-style-type: none"> • См.«Цефоперазон». Тяжелые госпитальные Г(+), Г(-)инфекции с документированной чувствительностью, кроме MRSA-инфекций
2	Цефтриаксон	<ul style="list-style-type: none"> • См. «Цефотаксим». При менингитах более эффективен, чем цефотаксим. В/м, когда необходимы цеф-III, но нет венозного доступа.
2	Цефтазидим	<ul style="list-style-type: none"> • Инфекции, вызванные <i>P. Aeruginosa</i> (нозокомиальная пневмония, осложненные инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов), при необходимости в сочетании с амикацином или ципрофлоксацином, интраабдоминальные инфекции, в сочетании с антианаэробными (метронидазол, линкомицин или клиндамицин, амоксициллин + клавулоновая кислота), сепсис, менингит, вызванные грамотрицательной флорой, подозреваемая или документированная инфекция, вызванная <i>Burkholderia cepacia</i>.
3	Цефтазидим/авибактам	<ul style="list-style-type: none"> • При доказанной полирезистентной инфекции
2	Цефепим	<ul style="list-style-type: none"> • Используется при неэффективности других цефалоспоринов, особенно III поколения. Нозокомиальная пневмония, осложненные инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей и суставов, интраабдоминальные инфекции, сепсис, менингит. Инфекции, вызванные <i>P. Aeruginosa</i> и <i>Enterobacter spp.</i> В сочетании с амикацином.
2	Имипенем-циластатин	<ul style="list-style-type: none"> • Нозокомиальная пневмония, интраабдоминальные и гинекологические инфекции, послеоперационные раневые инфекции, осложненные инфекции мочевыводящих путей, кожи, мягких тканей, костей, суставов, сепсис, вызванные полирезистентными патогенами ко всем β– лактамам, инфекции у пациентов с иммунодефицитом..
2	Меропенем	<ul style="list-style-type: none"> • при Г (-) инфекции, устойчивой к тиенаму • полирезистентные менингиты • инфекции, с показаниями к применению имипенема/циластатина у больных с судорожной готовностью
2	Эртапенем	<ul style="list-style-type: none"> • Тяжелые внегоспитальные инфекции, сепсис, вызванные чувствительной м\флорой(кроме инфекций, вызванных <i>Pseudomonas</i> и <i>Acinetobacter</i>)
2	Дорипенем	<ul style="list-style-type: none"> • Нозокомиальная пневмония, интраабдоминальные инфекции, осложненные инфекции мочевыводящих путей

2	Ванкомицин парентерально, внутри	<ul style="list-style-type: none"> Инфекции, вызванные MRSA (препарат выбора) и коагулазоотрицательными стафилококками, - пневмония, бактериальный эндокардит, инфекции суставов, сепсис (можно в сочетании с гентамицином и/или рифампицином), энтерококковые инфекции (при бактериальном эндокардите в сочетании с гентамицином, стрептомицином), псевдомембранозный колит (внутри только при неэффективности метронидазола). Профилактика послеоперационных инфекций (преимущественно в сердечно-сосудистой хирургии и ортопедии).
2	Линезолид	<ul style="list-style-type: none"> При непереносимости и неэффективности ванкомицина
3	Телаванцин	<ul style="list-style-type: none"> При неэффективности ванкомицина, линезолида
3	даптомицин	•
3	тедизолид	•
2	Гентамицин	<ul style="list-style-type: none"> Бактериальный эндокардит, сепсис. С β-лактамами. Бактериальные кератоконъюнктивиты, язвы роговицы.
3	Колистин	<ul style="list-style-type: none"> Резистентные инфекции, вызванные энтеробактериями, а также <i>P. aeruginosa</i>
1	Амикацин	<ul style="list-style-type: none"> Нозокомиальная пневмония, осложненные инфекции мочевыводящих путей; интраабдоминальные и тазовые инфекции; менингит, сепсис, в том числе вызванный штаммами <i>Enterobacteriaceae</i> и <i>P. aeruginosa</i>, резистентными к другим амингликозидам
2	Тобрамицин	<ul style="list-style-type: none"> См. показания к амикацину Бактериальные кератоконъюнктивиты, язвы роговицы.
1	Азитромицин	<ul style="list-style-type: none"> Тонзиллофарингит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония (включая атипичную), рожа, скарлатина, инфекции кожи и мягких тканей (включая угревую сыпь), инфекции ротовой полости, хламидиоз, уреаплазмоз, легионеллез (в сочетании с рифампицином), профилактика оппортунистических инфекций, тазовые инфекции (в сочетании с антианаэробными препаратами), профилактика острой ревматической лихорадки, при непереносимости бета-лактамов а\б. В педиатрии
1	Кларитромицин	<ul style="list-style-type: none"> Эрадикация <i>H. pylori</i>, альтернатива при "атипичных" инфекциях, при кокковых инфекциях (непереносимость бета-лактамов а\б), деконтаминация кишечника перед плановыми колоректальными операциями (в сочетании с канамицином).
2	Спирамицин	<ul style="list-style-type: none"> См. «Азитромицин», токсоплазмоз у беременных
1	линкомицин	<ul style="list-style-type: none"> См. клиндамицин
1	Клиндамицин	<ul style="list-style-type: none"> Стафилококковые, стрептококковые и анаэробные инфекции (альтернативный препарат), тонзиллофарингит (при аллергии на пенициллины), инфекции НДП (внебольничная пневмония, абсцесс легкого, эмпиема), интраабдоминальные и тазовые инфекции, инфекции кожи, мягких тканей, костей, суставов, сепсис. При тяжелых инфекциях с подозрением на смешанную флору необходимо сочетать с амингликозидами или фторхинолонами: некротизирующий фасцит, вызванный БГСА (в сочетании с высокими дозами пенициллина внутривенно и иммуноглобулинами внутривенно)
1	Доксициклин	<ul style="list-style-type: none"> Обострение хронического бронхита, инфекции, вызванные хламидиями, микоплазмами, риккетсиями, тазовые инфекции, в сочетании с β-лактамами и антианаэробными, хронический простатит

3	Ко - тримоксазол	<ul style="list-style-type: none"> Стафилококковые инфекции, вызванные MRSA (резерв), нозокомиальные инфекции, вызванные <i>S. Malthophilia</i>, листериоз (в сочетании с ампициллином), нокардиоз; пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз, гранулематоз Вегенера (длительный прием для поддержания ремиссии после терапии цитостатиками). Инфекции мочевых путей с документированной чувствительностью.
1	Метронидазол	<ul style="list-style-type: none"> Анаэробные инфекции (интраабдоминальные, тазовые, полости рта), протозойные инфекции (трихомониаз, амебиаз, лямблиоз), бактериальный вагиноз, псевдомембранозный колит, эрадикация <i>H. Pylori</i>, тяжелая угревая сыпь. Профилактика инфекций при операциях на толстой и прямой кишке
3	Нитрофурантоин	<ul style="list-style-type: none"> Острый цистит, длительная супрессивная терапия при хронических инфекциях мочевыводящих путей
1	Ципрофлоксацин	<ul style="list-style-type: none"> Обострение хронического бронхита, нозокомиальная пневмония, внебольничная пневмония (препарат резерва в случае непневмококковой этиологии); инфекции желчевыводящих путей; кишечные инфекции (шигеллез, сальмонеллез, кампилобактериоз); инфекции мочевыводящих путей; тазовые инфекции (в сочетании с антианаэробными препаратами); инфекции кожи, мягких тканей, костей, суставов; простатит; бактериальный конъюнктивит (местно). Предоперационная антибактериальная профилактика в урологии при операциях на предстательной железе. Бактериальные кератоконъюнктивиты, язвы роговицы.
1	Моксифлоксацин	<ul style="list-style-type: none"> острый синусит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония, инфекции кожи и мягких тканей
2	Левифлоксацин	<ul style="list-style-type: none"> Острый синусит, обострение хронического бронхита, внебольничная пневмония, инфекции мочевыводящих путей, инфекции кожи и мягких тканей при неэффективности и непереносимости β-лактамов. Бактериальные кератоконъюнктивиты, язвы роговицы.
2	Фосфомицин	<ul style="list-style-type: none"> Полирезистентные инфекции мочевых путей
3	Пиперациллин/тазобактам	<ul style="list-style-type: none"> инфекции нижних дыхательных путей; инфекции мочевыделительной системы; инфекции кожи и мягких тканей; внутрибрюшные инфекции; септицемия; бактериальные инфекции у больных с нейтропенией, в комбинации с аминогликозидами.
3	Цефтаролина фосамил	<ul style="list-style-type: none"> Лечение MRSA инфекций (резерв)
1	Изониазид	<ul style="list-style-type: none"> Туберкулез (в комбинации с другими препаратами)
1	Рифампицин	<ul style="list-style-type: none"> Санация носителей менингококка и <i>H. Influenzae</i> типа В (профилактика менингита), стафилококковые инфекции, вызванные MRSA или коагулазоотрицательными стафилококками (в сочетании с аминогликозидами, фузидином, ванкомицином, фторхинолонами), легионеллез (в сочетании с эритромицином)
1	Пиразинамид	<ul style="list-style-type: none"> Туберкулез (в комбинации с другими препаратами)
3	Этамбутол	<ul style="list-style-type: none"> Туберкулез (в комбинации с другими препаратами)
3	Тигециклин	<ul style="list-style-type: none"> Полирезистентные госпитальные инфекции. Препарат резерва
1	Нистатин	<ul style="list-style-type: none"> Кандидоз ЖКТ, кожи и видимых слизистых оболочек, генитальный кандидоз
2	Амфотерицин В	<ul style="list-style-type: none"> Глубокие микозы (кандидоз, аспергиллез, криптококкоз, бластомикоз, кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, гистаплазмоз, споротрихоз, мукороз).

2	Флуконазол	<ul style="list-style-type: none"> • Все формы кандидоза (включая менингит), криптококкоз (включая менингит), микозы кожи (микроспория, трихофития, эпидермофития), кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, споротрихоз, гистоплазмоз, бластомикоз. Профилактика микозов.
3	Каспофунгин	<ul style="list-style-type: none"> • Резистентные системные микозы
3	Микафунгин	<ul style="list-style-type: none"> • Профилактика и лечение микозов в трансплантологии
2	Вориконазол	<ul style="list-style-type: none"> • Резистентные системные микозы ,в т.ч.Candida kruzei, glabrata
3	позаконазол	<ul style="list-style-type: none"> • Для лечения инвазивных микозов в гематологическом отделении
1	Зидовудин	<ul style="list-style-type: none"> • Профилактика профессионального заражения у лиц, получивших уколы и порезы при работе с ВИЧ-загрязненным материалом
2	Ацикловир	<ul style="list-style-type: none"> • Инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные ВПГ-1 и ВПГ-2; опоясывающий лишай; ветряная оспа у взрослых больных с ненарушенным иммунным статусом; профилактика инфекций, обусловленных ВПГ у больных со сниженным иммунитетом.
2	Озельтамивир капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • грипп
2	Занамивир капсулы	<ul style="list-style-type: none"> • грипп
3	Ганцикловир	<ul style="list-style-type: none"> • Профилактика ЦМВ инфекции при пересадке почки

*С замечаниями и предложениями обращаться в КЭО